

Ficha técnica

Polillero Funnel suelo (PFS)

Trampa para la captura de polillas

Formato de venta:

Cajas de 20 unidades y donde únicamente se tiene que unir: la parte de arriba (tapa + embudo) con la base blanca, el soporte de anclaje con la base blanca y el cestillo verde con la tapa o con la base.

Descripción:

Polillero Funnel suelo es un polillero polivalente indicado especialmente para el seguimiento de vuelo (monitoreo) y captura masiva de una gran variedad de lepidópteros con la feromona apropiada: *Helicoverpa armiguera*, *Spodoptera littoralis*, *Spodoptera exigua*, *Plutella xylostella*, *Gortyna xanthenes*, *Plodia interpunctella*, etc.

Composición:

Se trata de una trampa que consta de:

1. Tapa superior que evita la entrada del agua en el polillero y está unida al embudo, cuyo diseño facilita la entrada de las polillas a la vez que impide que se escapen.
2. Base, donde caen los insectos capturados.
3. Cestillo que contendrá la feromona (puede anclarse en la parte inferior de la tapa superior o en el interior del recipiente).
4. Anclaje diseñado para que la trampa quede fijada al suelo mediante un tubo de PVC. El recipiente incorpora un punto de anclaje donde se tendrá que unir este soporte.
5. Soporte PVC 75cm.

Uso y dosis:

Uso	Dosis (*)
Monitoreo	2-5 polilleros/ha
Captura masiva	10-30 polilleros/ha

- Momento de colocación y de retirada:** El momento de colocación del Polillero Funnel vendrá determinado por la naturaleza de la plaga, el cultivo y el tipo de uso (monitoreo o captura masiva). Puede consultar el ciclo biológico de las plagas para determinar los momentos de aplicación más adecuados.
- De la misma forma, dependiendo de la naturaleza de la plaga, generaciones de ésta...retiraremos el polillero después de su uso para su reutilización en un futuro o lo mantendremos durante todo el ciclo. Si el periodo de inactividad de la plaga es breve podemos mantener el polillero ininterrumpidamente en el campo.
- Forma de colocación:** Clavando el tubo de PVC en el suelo. En el polillero se debe incorporar la feromona dentro del cestillo, en una de las dos posibles ubicaciones.